

PRO SCIENTIA ATQUE SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PURCHASED 1923 FROM
BOTANICAL GARDEN
Septemb 1899
R. W. Gibson. Invt

QK315
.H328
atlas
v.3

Leucanthemum coronopifolium (Vill.) — Krähenfussblättrige Wucherblume.

Alpenkette, trockene Stellen, 1500–2200 Meter, besonders auf Kalk. Juli–August.

Doronicum cordatum (Wulf. 1805) Kern. = cordifolium Sternb. 1818. — Herzblättrige Gemswurz.

Tirol bis Oesterreich. Wälder. 1000–1600 M., bes. auf Kalk, Juli, August.

Doronicum Austriacum Jacq. — Oesterreichische Gemswurz.

Tirol bis Oesterreich und Krain, feuchte Stellen, 1300 1900 M., bes. auf Kalk, Juli, August.

Aronicum scorpioides (L.) Reichenb. — Scorpionartige Krebswurz

Schweiz bis Kärnthen, auf Geröll, 1600—1900 M. Juli—August

Aronicum glaciale (Wulf.) Reichb. — Gletscher-Schwindelkraut.

Alpenkette, Gletscher, 1900—2600 M., auf Urgestein. Juli—August.

Arnica montana L. — Berg-Wohlverleih, Arnika.

Alpenkette, auf Triften, 1000 – 2000 M. Mai Juli.

Senecio abrotanifolius L. — Staubwurzblättriges Kreuzkraut.

Alpenkette, bes. auf Kalk, 1200—1600 M. Juni—August.

Senecio incanus L. — Weissgraues Kreuzkraut.

Schweiz bis Steiermark, 1900—2500 M. Juli—August.

Senecio carniolicus Willd. -- Krainisches Kreuzkraut

Ostalpen, bes. auf Urgestein, 1200—2000 M. Juli, August

Senecio cordifolius Gouan (1773) = cordatus Koch. — Herzblättriges Kreuzkraut.

Alpenkette, trockene Stellen. Sennhütten, 1300–1600 M. Juli. August.

Senecio Doronicum L. — Gemswurz-Kreuzkraut.
Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2300 M., bes. auf Kalk, Juli, August.

Cirsium spinosissimum (L.) Scop. — Vielstachelige Kratzdistel.
Alpenkette, Wiesen, 1300—2000 M., Juli, August.

Carduus defloratus L. — Abgeblühte Distel.

Alpenkette, auf Kalkboden, bis 1500 M. Juli—August.

Saussurea pygmaea (L.) Spreng — Zwergige Saussuree
Alpenscharte

Ostalpen, auf Kalkboden. 2000—2700 M Juli, August

Saussurea discolor (Willd.) De Cand. — Zweifarbige Saussuree, Alpenscharte.

Schweiz bis Krain u. Niederösterr., trockene Stellen, 2000—2700 M., auf Kalk, Juli. August.

Saussurea alpina (L.) De Cand. — Alpen-Saussuree.

Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 2000—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.

Saussurea macrophylla Saut. — Grossblättrige Saussuree.
Tirol und Salzburg, Juli, August.

Serratula heleniifolium Gren. & Godr. — Allantblättrige Scharte.

Schweiz bis Krain, auf Triften, 1600—2200 M. Juli, August.

Centaurea montana L. — Berg-Flockenblume.

Alpenkette, unter Gebüsch, bis 1600 M. Juli—August.

Centaurea plumosa Lam. (1793) = Phrygia Reichb. nec Koch nec L. = nervosa Willd. 1809. — Federige Flockenblume.

Schweiz bis Krain, Wiesen, 1600—2200 M., Juli, August.

Centaurea Phrygia L. — Phrygische Flockenblume.

Alpenkette, auf Wiesen, bis 1600 M Juli—September.

Aposeris foetida (L.) Less. — Stinkender Hainlattich.
Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M. Juli–August.

Leontodon saxatilis All. = Taraxaci All. 1785 sub Picris; Lois, Koch nec. L. — Felsen-Löwenzahn.

Alpenkette, trockene Stellen, 1900–2600 M., besonders auf Kalk, August-September.

Leontodon Pyrenaicus Gouan. — Pyrenäischer Löwenzahn.

Alpenkette, Wiesen, 1200—1900 M., Juli, August.

Scorzonera rosea Waldst. & Kit. — Rosenrothe Schwarzwurz.

Kärnten und Krain, Wiesen, bei 1600 M., Mai, Juni.

Hypochoeris uniflora L. — Einköpfiges Ferkelkraut.

Schweiz bis Steiermark, auf Triften. 1300—1900 M Juli—August.

Willemetia stipitata (Jacq. 1775) = hieracioides Monn. (1825).
= apargioides (Willd 1796) — Gestielte Willemetie.

Alpenkette, auf Triften, bis 2000 M. Juni—August.

Taraxacum nigricans Kitaib. = officinale Wigg. var. γ alpinum Koch. — Schwärzliche Kuhblume.

Alpenkette, Wiesen, 1500–2200 M., Juni—September.

Taraxacum Pacheri Schultz. Bip. — Pacher's Kuhblume.
Kärnten: Salmshöhe, Juni, Juli.

Mulgedium alpinum (L.) Less. — Alpen-Milchlattich.

Alpenkette, Gebüsch bis 1600 M. Juli—August

Crepis aurea (L.) Cass. — Goldener Pippau.

Alpenkette, auf Wiesen, bes. Kalkboden, 1600—2500 M. Juni—August.

Crepis pygmaea L. — Kleiner Pippau.
Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1600–2500 M., Juli, August.

Crepis jubata Koch = chrysantha Koch nec Fröl. — Bemähnter Pippau.

Schweiz und Tirol, auf Gerölle, 1800—2700 M. Juli—August.

Crepis Terglouensis (Hacq. 1782) Kern. = Soyeria hyoseridifolia Vill. 1807 sub Hierac. Koch. — Terglou'scher Pippau.

Kalk-Alpenkette, trockene Stellen, 2200—2600 M. Juli—August.

Crepis pontana (L.) = Soyeria montana Jacq. 1774 sub Hierac.; Moun. — Linne's Pippau.

Alpenkette, Wiesen, 1600—1900 M., Juli, August.

Crepis alpestris (Jacq.) Tausch. — Voralpen Pippau.
Alpenkette, trockene Stellen, bis 1600 M., auf Kalk. Mai-August.

Crepis chondrilloides (L.) nec Jacq. = Jacquini Tausch. — Knorpelsalatartiger Pippau.

Alpenkette, trockene Stellen, 1500—2000 M. auf Kalk, Juli, August,

Hieracium staticefolium Vill. — Widerstossblättriges Habichtskraut.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 1800 M., bes. auf Kalk. Juli, August.

Hieracium aurantiacum L. — Orangerothes Habichtskraut.

Alpenkette, auf Wiesboden, zw 1300—2600 M. häufig. Juni—

Hieracium intybaceum Wulf. = albidum Vill — Wegwarteartiges Habichtskraut.

Centralalpen, im Gerölle, 1400—2000 M. Juli August

Hieracium alpinum L. = pilosum Schleich. Griseb. — Alpen-Habichtskraut.

Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 1500—2200 M., Juli, August.

Hieracium villosum L. — Zottiges Habichtskraut

Alpenkette, trockene Stellen, 1200—2000 M. auf Kalk. Juni—August.

Phyteuma comosum L. — Schopfige Rapunzel

Kalkfelsen in Südtirol und Krain, 600—1500 M. Juni—August

Phyteuma Scheuchzeri All. — Scheuchzers Rapunzel.

Tirol bis Krain, trockene Stellen, 1300—2200 M., Juli, August.

Phyteuma Sieberi Spreng. — Sieber's Rapunzel

Ostalpen (Tirol bis Krain), 1500—2200 M. Juli, August

Phyteuma pauciflorum L. — Armblüthige Rapunzel.

Schweiz bis Steiermark, 1850—2800 M. Juli—August.

Phyteuma humile Schleich. — Niedrige Rapunzel.

Schweiz bis Salzburg und Kärnten, trockene Stellen, 2000–2700 M., auf Urgestein, Juli, August.

Phyteuma hemisphaericum L. — Halbkugelige Rapunzel.
Schweiz bis Steiermark, Wiesen, 1500—2200 M., auf Urgestein, Juli, August.

Phyteuma latifolium (Heuff. v. 1858) = confusum Kern. 1870.
— Breitblättrige Rapunzel.

Kärnten u. Steiermark, Wiesen 1500—2200 M. auf Urgestein, Juli, August.

Phyteuma betonicaefolium Vill. = Michelii Bert. var α Koch.
— Betonienblättrige Rapunzel.
Alpenkette, Wiesen, bis 2000 M., Mai—Juli.

Campanula barbata L. — Bartige Glockenblume.

Alpenkette, auf Triften, 800—1800 M. Juni—Au[illegible].

Campanula alpina L. — Alpen-Glockenblume.

Tirol bis Oesterreich u. Steiermark, trockene Stellen, 1000 - 2100 M., auf Kalk. Juli, August.

Campanula thyrsoidea L. — Straussblüthige Glockenblume.

Alpenkette, 1600—2100 M. Juli, August

Campanula Cenisia L. — Cenis'sche Glockenblume.

Rhaeticon-Gebiet, Gerölle über 1800 M. Juli – August.

Campanula Morettiana Reichenb. — Moretti's Glockenblume

Fassa- und Fleimserthal, Südtirol, um 2200 M. Juli, August

Campanula Zoysii Wulf. — Zoys' Glockenblume.

Ost-Alpen, Kärnten, Steiermark und Krain, trockene Stellen, 2000–2700 M., auf Kalk, Juli, August.

Campanula pulla L. — Dunkelblaue Glockenblume.

Salzburg bis Krain, trockene Stellen, 1300–1900 M. Juli, August.

Campanula linifolia Scop. (1772) = Carnica Schiede 1812. — Linienblättrige Glockenblume.

Krain, trockene Stellen, über 1600 M., Juni, Juli.

Campanula Scheuchzeri Vill. — Scheuchzer's Glockenblume.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 2000 M. Juli—September

Edrajanthus Croaticus Kern. = Kitaibelii Koch et aut. nec de Cand. — Kroatische Krugglocke.

Krain, Wiesen, um 1300 M., Juli.

Vaccinium uliginosum L. — Moosbeere.

Alpenkette, Gebüsch, 1300—2000 M., Mai—Juli.

Arctostaphylos alpina (L.) Spreng. — Alpen-Bärentraube.
Alpenkette, trockene Stellen, 1500—2000 M., bes. auf Kalk, Mai—Juli.

Arctostaphylos Uva ursi (L.) Spreng. = officinalis Wimm. & Grab. — Gemeine Bärentraube.

Alpenkette, trockene Stellen, 1500–2000 M., bes. auf Kalk, Mai—Juli.

Calluna vulgaris (L.) Salisb. — Gemeine Besenheide.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 2000 M., bes. auf Schieferboden, August—October.

Erica carnea L. — Fleischrothe Heide.

Alpenkette, auf Mergelboden, 370—2200 M. März—Mai.

Azalea procumbens L. — Niederliegende Alpenheide.

Alpenkette, trockene Steilen 1500—2000 M., bes. auf Schieferboden, Mai—August.

Rhododendron Chamaecistus L. — Zwerg-Alpenrose.
Tirol bis Krain, trockene Stellen, 1200–1900 M., auf Kalk. Mai–Juli.

Rhododendron hirsutum. L. — Rauhhaarige Alpenrose.

Alpengebiet, bes. auf Kalkboden, 1400—2300 M. Mai—Juli.

ca.

Rhododendron ferrugineum L. — Rostrothe Alpenrose.

Alpenkette, bes. auf Urgestein, 1300—2000 M. Juni—August.

Pirola uniflora L. — Einblüthiges Birnkraut.

Alpenkette, auf Humusboden, 550—1600 M. Juni—August.

Pirola secunda L. — Einseitswendiges Birnkraut.

Alpenkette, unter Gebusch, bis 1700 M. Juni—Juli.

Ilex Aquifolium L. — Immergrüne Stechpalme.

Schweiz bis Oesterreich, Wälder, Gebüsch, bis 1500 M., Mai–Juli

Sweertia perennis L. — Ausdauernde Swertie Tarant.

Alpenkette, feuchte Stellen, 1500—2300 M. Juli—August.

Lomatogonium Carinthiacum (Wulf.) A. Br. — Kärntnerische Saumnarbe.

Schweiz, Tirol, Salzburg und Kärnten, trockene Stellen, 1500—2300 M. bes. auf Kalk. August, September.

Gentiana lutea L. — Gelber Enzian

Alpenkette, auf Triften, 1100—1630 M. Juli August.

Gentiana purpurea L. — Purpurrother Enzian.
Schweiz, Vorarlberg und Tirol, Wiesen um 1600 M., Juli, August.

Gentiana punctata L. — Punktirter Enzian.

Ostalpen, auf Alpenwiesen 1,500—2500 M. Juli—August.

Gentiana Pannonica Scop. — Pannonischer Enzian.

Schweiz bis Oesterreich, Wiesen, 1300—2000 M., auf Kalk. Juli, August.

Gentiana tenella Rottb. — Zarter Enzian.

Schweiz bis Kärnten, Gletscher, 1900–2600 M. August—September.

Gentiana nana Wulf. — Zwerg-Enzian.

Salzburg und Kärnten, Gletscher, 2200–2900 M. Juli–September.

Gentiana asclepiadea L. — Schwalbenwurzartiger Enzian.

[illegible] Gebirge, bis 1700 M., bes. auf Kalk; auch auf Urgestein. August, September.

Gentiana Clusii Song. u. Perr. = acaulis aut.; Linn. var. β. — Clusius' Enzian.

Alpenkette, auf Kalkboden, 500—2400 M. Juni—August.

Gentiana acaulis (L. v.) nec aut. = excisa Presl. 1828; Kochiana Perr & Song. 1855. — Stengelloser Enzian.

Alpenkette, Wiesen, 1400–2000 M. bes. auf Urgestein, Juni, Juli.

Gentiana Frölichii Jan. — Fröhlich's Enzian.
Kärnten und Krain, trockene Stellen, über 1800 M., August, September

Gentiana frigida Hänke. — Kälteliebender Enzian.

Steiermark, trockene Stellen, über 1800 M., auf Granit. Juli–September.

Gentiana Bavarica L. — Baierischer Enzian.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2500 M. auf Kalk, Juli, August.

Gentiana imbricata Frol — Dachblättriger Enzian

Ostalpen von Tirol bis Krain, 2100—3000 M Juli, August.

Gentiana pumila Jacq. – Niedriger Enzian.

Tirol bis Oesterreich und Krain, Wiesen, 1600—2000 M. Juli, August.

Gentiana brachyphylla Vill. — Kurzblättriger Enzian.
Schweiz bis Steiermark, Wiesen, 1900–2800 M., auf Urgestein, Juli, August.

Gentiana angulosa M. Bieb. = aestiva R. u. Sch. — Geflügelter Enzian.

Alpenkette, auf Triften, bis 2200 M. Juni, Juli

Gentiana utriculosa L. — Blasiger Enzian.

Alpenkette, feuchte Stellen, bis 1700 M., Juni—August.

Gentiana nivalis L. — Schnee-Enzian.

Alpenkette, auf Triften, 1500–2600 M. Juli–August.

Gentiana prostrata Hänke — Niedergestreckter Enzian.
Tirol bis Oesterreich und Krain, Wiesen, 2000—2800 M., Juli, August

Polemonium coeruleum L. — Blaues Sperrkraut.

Schweiz bis Krain, Gebüsch, bis 1500 M., Mai, Juni.

Cerinthe alpina Kit. — Alpen-Wachsblume.

Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, bis 1680 M., Juni—August.

Myosotis alpestris Schmidt = silvatica Hoffm. var β Koch et aut — Alpen-Vergissmeinnicht.

Alpenkette, auf Wiesen und Gerölle, 1200—2000 M. Juni, Juli.



Eritrichium Terglouense (Hacq.) Kern = nanum (All) Schrad. — Terglou'scher Himmelsherold.

Schweiz bis Krain, auf Urgebirge, 1800—2300 M. Juli, August.

Linaria alpina L. — Alpen-Leinkraut.

Alpenkette, bes. auf Kalk. 1600 —2000 M. Juni—September.

Erinus alpinus L. — Alpen-Leberbalsam.

Schweiz und Tirol, trockene Stellen, Wiesen, 1300—2400 M., Mai—Juli.

Veronica fruticulosa L. — Kleinstrauchiger Ehrenpreis.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M. auf Urgestein, Juli, August.

Veronica saxatilis Scop. — Felsen-Ehrenpreis

Alpenkette, auf Gerölle, 1500—2400 M Juni Juli

Veronica alpina L. — Alpen-Ehrenpreis.

Alpenkette, auf Triften, 1200 - 2500 M. Juni—August.

Veronica bellidioides L. — Massliebchenartiger Ehrenpreis.

Alpenkette, auf Gerölle, 1500—1850 M. Juli—August.

Veronica latifolia L. (1753) = urticaefolia Jacq. 1773 — Breitblättriger Ehrenpreis.

Alpenkette, Gebüsch, bis 1600 M., Juni, Juli.

Veronica aphylla L. — Blattloser Ehrenpreis.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 1200—2300 M. Juni—August.

Paederota Bonarota L. — Blaue Paederote, Mänderle.
Südtirol bis Krain, trockene Stellen, über 1500 M., Juni—August.

Paederota Ageria L. — Gelbe Päderote, Mänderle.

Süd-Tirol bis Krain, trockene Stellen, über 1500 M., Juni — August.

Wulfenia Carinthiaca Jacq. — Kärntnerische Wulfenie, Kuhtritt.

Oberkärnten: Kühweger- und Watschigeralpe im Gailthal, über 1500 M., Juli, August.

Tozzia alpina L. — Alpen-Tozzie.

Alpenkette, bes. auf Kalk, 1300—2300 M. Juni, Juli.

Melampyrum laricetorum Kern i. sched. (1870). — Lärchen-Wachtelweizen.

Tirol, Central-Alpenkette, Wiesen, 1300—2000 M., auf Schiefer, Juli, August.

Pedicularis acaulis Scop. — Stängelloses Läusekraut.

Südtirol bis Krain, auf Triften, 1300—2000 M. April—Mai.

Pedicularis verticillata L. — Quirlblättriges Läusekraut

Alpenkette, bes. auf Kalk, Triften, 1200—2100 M. Juni—August.

Pedicularis incarnata Jacq. — Fleischrothes Läusekraut.

Alpenkette, Wiesen, 1200—2000 M., Juli, August.

Pedicularis asplenifolia Flörke. — Farrenblättriges Läusekraut.
Schweiz bis Salzburg und Steiermark, feuchte Stellen, 2000—2500 M., bes. auf Urgestein.
Juli, August

Pedicularis rostrata L. = Jacquini Koch et aut. — Geschnabeltes Läusekraut.

Schweiz bis Oesterreich, Triften auf Kalk, 1200—2200 M. Juli—August

Pedicularis Kerneri D. T. non Huter. = rostrata Koch et aut. nec L. = Rhaetica Kern. — Kerner's Läusekraut.

Schweiz bis Salzburg und Krain, feuchte Stellen, 1500—2500 M., auf Urgestein, Juli, August.

Pedicularis geminata Portenschl. (1821) = Portenschlagii Saut.
— Gezweites Läusekraut.

Tirol bis Salzburg und Steiermark, Wiesen, 2000—2600 M., auf Granit und Urgestein.
Juli—August.

Pedicularis rosea Wulf. — Rosenrothes Läusekraut.
Tirol bis Krain, Wiesen, 1600—2200 M., bes. auf Kalk, Juli, August.

Pedicularis recutita L. — Beschnittenes Läusekraut.

Schweiz bis Ob.-Oesterreich und Steiermark, feuchte Stellen, 1200—2200 M., Juni—August.

Pedicularis tuberosa L. — Knolliges Läusekraut.

Schweiz bis Salzburg und Krain, feuchte Stellen, 1300—2200 M., Juli, August.

Pedicularis versicolor Wahlenb. = Oederi aut. nec Vahl. — Buntes Läusekraut.

Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen, 1600—2200 M., Juni—August.

Pedicularis foliosa L. – Blattreiches Läusekraut.

Alpenkette Triften auf Kalk[illegible] 1000– 2200 M. Juni—August

Rhinanthus aristatus Čelak. = alpinus Koch & aut. p. p. nec Baumg. — Begrannter Klappertopf.

Alpenkette, Wiesen, 1300—2200 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.

Bartsia alpina L. — Alpen-Bartsie.

Alpenkette, 1300—1700 M. Juni—August

Euphrasia Salisburgensis Funke. — Salzburgischer Augentrost.
Alpenkette, Wiesen, bis 1900 M., bes. auf Urgestein, Juli, August.

Euphrasia minima Jacq. = officinalis var. β Lam.; pratensis var. α Reichb.; nemorosa var. ζ Soy. — Kleinster Augentrost.

Alpenkette, Wiesen, 1800–2400 M.; besonders auf Schiefer, Juli–August.

New York Botanical Garden Library
QK 315 .H328 v.3
Hartinger, Anton/Atlas der Alpenflora
gen
3 5185 00108 4050